


# CO RODZICE WIEDZĄ O ROTAWIRUSACH




Sprawdź, jakie informacje na temat zakażeń rotawirusowych oraz możliwości ochrony przed nimi mają kobiety w ciąży i młode matki w Polsce<sup>1</sup>.


## JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE OBJAWY I JAKIE MOGĄ BYĆ KONSEKWENCJE ZAKAŻENIA ROTAWIRUSOWEGO?



## CZY ZGADZA SIĘ PANI Z NASTĘPUJĄCYMI STWIERDZENIAMI?



Rotawirusy są najgroźniejsze dla najmłodszych dzieci.



Zakażenia rotawirusowe przechorowuje większość małych dzieci.

■ TAK □ NIE ■ NIE WIEM


### JAK POWAŻNA JEST CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ ROTAWIRUSY?




### NA ILE UCIAŻLIWA JEST CHOROBA WYWOŁYWANA PRZEZ ROTAWIRUSY?




### CZY SŁYSZAŁA PANI O MOŻLIWOŚCI ZASZCZEPIONIA DZIECKA PRZECIW ROTAWIRUSOM?



■ Tak  
■ Nie, ale słyszałam o rotawirusach  
□ Nie i nie słyszałam o rotawirusach



Czy Pani dziecko jest **zaszczepione** przeciw rotawirusom?



Czy orientuje się Pani, w jakim wieku można **szczepić** dziecko przeciw rotawirusom?

## PAMIĘTAJ!

Prawie **każde** dziecko do 5. roku życia ulegnie zakażeniu rotawirusowemu<sup>2</sup>.



Zakażenie rotawirusowe może prowadzić do **odwodnienia**, a w konsekwencji do **hospitalizacji**<sup>3</sup>.



Szczepienie przeciw rotawirusom należy rozpocząć **do 12. tygodnia** życia dziecka<sup>4</sup>.



### Materiał powstał w ramach kampanii informacyjnej „Powstrzymaj rotawirusy”

Referencje:

- Szczepienia dziecięce. Postawy i stosowanie przez kobiety w ciąży i młode matki. Warszawa 2019 r., w badaniu wzięło udział 398 kobiet, w tym w III trymestrze ciąży, matki noworodków i dzieci. [https://pl.gsk.com/media/768790/mb\\_tracking\\_matek\\_26-02-18\\_edit.pdf](https://pl.gsk.com/media/768790/mb_tracking_matek_26-02-18_edit.pdf); (dostęp: listopad 2019)
- Bernstein DI. Rotavirus Overview Pediatr. Infect. Dis. J. 2009;28:50-53
- Parashar, et al. Rotavirus, Emerg. Infect. Dis. 1998; Vol 4:561-570
- Espid Consensus Recommendations for Rotavirus Vaccination in Europe

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu [www.urpl.gov.pl](http://www.urpl.gov.pl) lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy. Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.