


SKUTKI INFEKCJI ROTAWIRUSOWEJ




ponad **80%**
dzieci z zakażeniem
rotawirusowym ulega
odwodnieniu²



ODWODNIENIE

TO JEDNO Z NAJCZĘSTSZYCH
I NAJPOWAŻNIEJSZYCH
POWIKŁAŃ OSTREJ
BIEGUNKI U DZIECI¹



ok. **40%**
dzieci z biegunką
rotawirusową wskutek
ciężkiego odwodnienia
wymaga hospitalizacji³

OBJAWY ODWODNIENIA⁴



Zmiana zachowania
(mniejsza aktywność,
senność, rozdrażnienie)



**Rzadkie i/lub skąpe
oddawanie moczu**



**Placz
bez łez**



**Większe
pragnienie**



**Ubytek
masy ciała**



**Zapadnięte
gałki oczne**



**Zapadnięte ciemię
(u niemowląt)**



**Suche śluzówki,
sucha skóra**



JEŻELI POWYŻSZE OBJAWY WYSTĘPUJĄ U DZIECKA,
POWINNO ONO ZOSTAĆ ZBADANE PRZEZ LEKARZA
W CELU OCENY STOPNIA ODWODNIENIA⁴.



STOPNIE ODWODNIENIA – WEDŁUG WHO⁵

1

I STOPIEŃ
odwodnienie małego
stopnia (spadek masy
ciała < 3%)

2

II STOPIEŃ
odwodnienie łagodne
i umiarkowane (spadek
masy ciała o 3–9%)

3

III STOPIEŃ
ciężkie odwodnienie
(spadek masy ciała > 9%)



**KONIECZNA
HOSPITALIZACJA** !

Szczepienie ochronne
to najskuteczniejsza
metoda zapobiegania
bieguncie rotawirusowej⁶.



85–98%

DZIECI ZASZCZEPIONYCH PRZECIW ROTAWIRUSOM
JEST CHRONIONYCH PRZED CIĘŻKĄ POSTACIĄ
BIEGUNKI I JEJ SKUTKAMI^{7,8}.

Materiał powstał w ramach kampanii informacyjnej „Powstrzymaj rotawirusy”

¹. Szajewska H., Falszewska A., Ostra biegunka infekcyjna u dzieci – co mówią aktualne dane?; w: Zakażenia XXI wieku 2018, 1(2) ². Szymański H., Chmielewska A., Szajewska H., Powikłania zakażenia rotawirusowego – przegląd piśmiennictwa, w: Standardy medyczne – Pediatria, przedruk z Nr 3, om 14, 2017 ³. Szwajkowska M., Załęski A., Kuchar E., Niespodziewane następstwa zakażenia rotawirusowego u dwuletniego chłopca, w: Forum Pediatrii Praktycznej ⁴. <https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/lista/62056,objawy-odwodnienia> (dostęp: lipiec 2019) ⁵. <https://forumpediatrii.pl/artykul/odwodnienie-u-dzieci-i-jego-parenteralne-wyrownywanie> (dostęp: lipiec 2019) ⁶. Red. Chybicka A., Dobrzańska A., Szczapa J., Wysocki J., Pierwsze 2 lata życia dziecka, Przewodnik dla rodziców, Medycyna Praktyczna, Kraków 2012 ⁷. <http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/rotawirusy/3/#dlaczego-warto-sie-szczepic-przeciw-rotawirusom> (dostęp: lipiec 2019) ⁸. Mrukowicz, Szczepienie przeciwko rotawirusom 2015, 1-26 (1.0)

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy. Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.